

FOLHETO INFORMATIVO

Bepanthene Plus

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.

Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica.

No entanto, é necessário utilizar Bepanthene Plus com precaução para obter os devidos resultados.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, solicite os serviços do farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde, consulte o seu médico.

1. O QUE É BEPANTHENE PLUS E PARA QUE É UTILIZADO

Bepanthene Plus é um creme refrescante que desinfecta e estimula a cicatrização da pele.

Bepanthene Plus contém como princípios activos o dexpanthenol e o cloridrato de cloro-hexidina. O dexpanthenol quando penetra na pele, transforma-se rapidamente em ácido pantoténico, também chamado vitamina B₅. A sua acção acelera a multiplicação das células e a formação de tecido novo, e reforça a resistência (elasticidade) das cicatrizes.

O cloridrato de cloro-hexidina é um antisséptico que combate as bactérias que existem habitualmente na pele e contaminam as feridas. Deste modo, o cloridrato de cloro-hexidina evita e combate as infecções.

O Bepanthene Plus, além de antisséptico e cicatrizante, impede que a pele seque, acalma a dor graças ao seu efeito refrescante e é bem tolerado.

O Bepanthene Plus aplica-se e elimina-se com facilidade, não engordurando nem aderindo à pele.

Composição

Cada 1 grama de creme contém:

50 mg de dexpanthenol e 5 mg de cloridrato de cloro-hexidina.

Os outros ingredientes são DL-pantolactona, álcool cetílico, álcool estearílico, vaselina, parafina líquida, lanolina, estearato de polioxilo 40, água purificada.

Bepanthene Plus está disponível em bisnagas de 30 g de creme.

Para que se utiliza Bepanthene Plus

Para o tratamento de feridas superficiais como cortes, bolhas, arranhões, escoriações, rágadas, ulcerações, queimaduras ligeiras, cicatrizes recentes.

2. O QUE DEVE SABER ANTES DE UTILIZAR BEPANTHENE PLUS

Não utilize Bepanthene Plus

- se sabe que tem hipersensibilidade (alergia) ao dexpanthenol, à cloro-hexidina ou a qualquer outro ingrediente.

- as feridas graves, profundas ou muito sujas devem ser tratadas pelo médico.

Tome em atenção quando utilizar Bepanthe Plus

Evite o contacto do creme com os olhos e as mucosas.

Se a pele está irritada mas não apresenta feridas (queimaduras solares) e, portanto, não há risco de infecção, utilize Bepanthe creme que é igualmente refrescante mas não contém antisséptico.

Para aplicação em maiores extensões de pele pode utilizar Bepanthe Loção.

Para prevenir o eritema das fraldas ou as fissuras dos seios, adoptar de preferência Bepanthe unguento que contém um elevado teor de gordura e forma uma barreira protectora da humidade.

Sendo o Bepanthe Plus para utilização em períodos de curta duração, se verificar agravamento e/ou atraso na cicatrização deverá consultar o médico.

Gravidez e aleitamento

Bepanthe Plus pode ser utilizado durante a gravidez e o aleitamento, no entanto, não deve ser utilizado sobre grandes extensões de pele.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não aplicável.

Utilizar Bepanthe Plus com outros medicamentos

Bepanthe Plus não deve ser usado simultaneamente com outros antissépticos ou desinfectantes. Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a aplicar outros medicamentos.

3. COMO APLICAR BEPANTHENE PLUS

Limpe a ferida o melhor possível e aplique uma fina camada de Bepanthe Plus. Se necessário, pode cobrir a ferida com um penso adesivo ou gaze.

Aplique o Bepanthe Plus várias vezes ao dia até à cicatrização das feridas.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Em casos muito raros podem ocorrer reacções cutâneas alérgicas. Neste caso, deve parar o tratamento e consultar o médico.

Caso detecte efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. CONSERVAÇÃO DE BEPANTHENE PLUS

Manter fora do alcance das crianças.

Não conservar acima de 25°C

Não utilize após expirar o prazo de validade indicado na embalagem.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do titular da autorização de introdução no mercado:

Bayer Portugal S.A.
Rua Quinta do Pinheiro, 5
2794-003 Carnaxide

Data da última revisão
Janeiro 2005

Este folheto foi aprovado pela última vez em