

FOLHETO INFORMATIVO/ Patient Information leaflet

CANESTEN 1% Pó cutâneo

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.

Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica.

No entanto, é necessário utilizar Canesten Pó cutâneo com precaução para obter os devidos resultados.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, solicite os serviços do farmacêutico.
- No acto da aquisição aconselhe-se com o seu farmacêutico; em caso de agravamento ou persistência dos sintomas consulte o seu médico.

Este folheto tem as seguintes informações:

- 1. O que é Canesten Pó cutâneo**
- 2. Para que é utilizado Canesten Pó cutâneo**
- 3. O que é preciso saber antes de utilizar Canesten Pó cutâneo**
- 4. Como utilizar Canesten Pó cutâneo**
- 5. Efeitos secundários possíveis de Canesten Pó cutâneo**
- 6. Como conservar Canesten Pó cutâneo**

Canesten Pó cutâneo apresenta-se na forma de pó cutâneo para uso externo (uso cutâneo).

1 g de pó contém 10 mg de clotrimazol.

Canesten Pó cutâneo encontra-se disponível em frascos contendo 30 g de pó cutâneo.

Outros componentes

Canesten Pó cutâneo contém o seguinte componente: amido de arroz.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

BAYER PORTUGAL S.A.
Rua da Quinta do Pinheiro, 5
2794-003 Carnaxide

1. O que é Canesten Pó cutâneo

Canesten Pó cutâneo contém a substância activa clotrimazol pertencente a um grupo de substâncias conhecidas como "antifúngicos".

O clotrimazol possui um amplo espectro de actividade o que lhe permite a eliminação eficaz de um grande número de fungos, responsáveis por várias doenças da pele (micoses intertriginosas) localizadas nomeadamente nas mãos e pés

2. Para que é utilizado Canesten Pó cutâneo

Canesten Pó cutâneo é utilizado para tratamento local de várias infecções fúngicas (micoses intertriginosas) localizadas nomeadamente:

- Nas mãos e pés (conhecido por “ pé de atleta”).

Canesten Pó cutâneo está especialmente indicado na profilaxia de recidivas de infecções fúngicas da pele, em especial das zonas da pele com mais humidade, como sejam as virilhas e os espaços entre os dedos dos pés (pé-de-atleta).

Canesten Pó cutâneo é usado como adjunto ao tratamento com Canesten Creme e Canesten Solução para pulverização cutânea..

3. O que é preciso saber antes de utilizar Canesten Pó cutâneo

Situações em que não deve utilizar Canesten Pó cutâneo

Se apresenta a situação abaixo descrita não deverá utilizar Canesten Pó cutâneo:

- Alergia ao clotrimazol ou ao outro ingrediente do medicamento.
Consulte também o “Outros ingredientes” para verificar se é alérgico ou intolerante ao outro ingrediente (amido de arroz).
Se não tem a certeza de já ter tido qualquer alergia devida ao clotrimazol consulte o seu médico.

Situações em que o Canesten Pó cutâneo deve ser utilizado com precaução

Se apresenta a situação abaixo descrita deverá ser prudente ao aplicar Canesten Pó cutâneo:

- Quando aplicado na zona das virilhas, junto à área genital pode reduzir a segurança e a eficácia de produtos à base de látex, tais como: preservativos ou diafragma e também a eficácia de espermicidas vaginais, utilizados como método anticoncepcional – este efeito é temporário e ocorre apenas durante o tratamento.

Gravidez e aleitamento

Se estiver grávida ou a amamentar consulte o seu médico antes de tomar qualquer medicamento.

Nos três primeiros meses da gravidez, como todos os medicamentos, Canesten Pó cutâneo só deverá ser utilizado por recomendação médica.

Crianças e idosos

Canesten Pó cutâneo pode ser aplicado tanto em crianças como em idosos.

Efeitos sobre a capacidade de condução de veículos e utilização de máquinas

Não foram observados efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

Utilização de Canesten Pó cutâneo com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a utilizar ou tiver utilizado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica.

Neste caso, não se conhecem alterações do efeito de Canesten Pó cutâneo, pelo facto de se tomarem outros medicamentos.

4. Como utilizar canesten Pó cutâneo

Adultos e crianças:

Utilize Canesten Pó cutâneo sempre de acordo com as instruções. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Canesten Pó cutâneo deverá ser aplicado na zona a tratar, polvilhando – a, duas a três vezes por dia.

No caso de, do pé-de-atleta, Canesten Pó cutâneo, deverá ser também polvilhado nas meias e sapatos por forma a absorver a humidade e prevenir a reinfeção.

Canesten Pó cutâneo deve ser utilizado após a aplicação do Canesten creme ou Canesten Solução para pulverização cutânea..

Duração do tratamento

No geral os sintomas desaparecem após os seguintes períodos de tratamento:

Micoses intertriginosas 3 - 4 semanas

Para assegurar uma cura completa o tratamento deverá prosseguir, depois da indicação, durante cerca de 2 semanas após desaparecimento dos sintomas.

Caso se tenha esquecido de aplicar Canesten Pó cutâneo

Se se esqueceu de aplicar o medicamento deverá retomar a aplicação, sem aplicar uma dose a dobrar para compensar a que se esqueceu de aplicar.

Medidas a tomar em caso de sobredosagem

Não se aplica.

5. Efeitos secundários possíveis de Canesten Pó cutâneo

Como todos os medicamentos, Canesten Pó cutâneo pode ter efeitos secundários:

Os efeitos mais frequentes são:

- Reacções alérgicas e dor local.
- Comichão (prurido) e vermelhidão da pele.

Caso detecte efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

6. Conservação do Canesten Pó cutâneo

- Manter o frasco bem fechado.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Comunique ao seu médico ou farmacêutico a ocorrência de qualquer efeito indesejável não mencionado neste folheto.
- Verifique sempre o prazo de validade dos medicamentos inscrito na embalagem. Não usar medicamentos depois de ultrapassado o prazo de validade indicado na embalagem.

PARA MAIS INFORMAÇÕES

Se tem alguma dúvida ou pergunta sobre Canesten Pó cutâneo contacte o seu médico ou farmacêutico.

DATA DA ELABORAÇÃO DO FOLHETO

Fevereiro de 2006