

FOLHETO INFORMATIVO

Rennie Digestif Comprimidos para mastigar (pastilhas)

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.

Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica.

No entanto, é necessário utilizar Rennie com precaução para obter os devidos resultados.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, solicite os serviços do farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde, consulte o seu médico.

1. O QUE É Rennie E PARA QUE É UTILIZADO

Composição

As substâncias activas do Rennie são o carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio.

Cada comprimido para mastigar (pastilha) contém 680 mg de carbonato de cálcio e 80 mg de carbonato de magnésio.

Os outros ingredientes são sacarose, amido de milho pré-gelatinizado, amido de batata, talco, estearato de magnésio, parafina, aroma de hortelã e aroma de limão.

Rennie pertence a um grupo de medicamentos denominados antiácidos.

Rennie está disponível em embalagens de 6, 24, 48 e 96 comprimidos para mastigar (pastilhas) acondicionadas em blisters.

Para que se utiliza o Rennie

Rennie é um medicamento antiácido que neutraliza a acidez do estômago. Rennie alivia rapidamente os sintomas da hiperacidez gástrica (excesso de ácido no estômago), tais como azia, dor retrosternal, indigestão, enfartamento, sensação de peso no estômago, regurgitação, náuseas, vômitos, dores de estômago pontuais.

2. O QUE DEVE SABER ANTES DE TOMAR Rennie

Não tome Rennie

- se tem hipersensibilidade (alergia) às substâncias activas ou a qualquer outro ingrediente deste medicamento
- se sofre de insuficiência renal grave
- se tem níveis elevados de cálcio no sangue (hipercalcemia)

Tome especial cuidado com Rennie

- os doentes com insuficiência renal não devem tomar Rennie durante períodos de tempo longos.

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Rennie pode ser tomado durante a gravidez e a amamentação, sem risco para o feto ou a criança.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Rennie não diminui a capacidade para conduzir veículos ou utilizar máquinas.

Informações importantes sobre alguns ingredientes do Rennie

Este medicamento contém sacarose, pelo que não deve ser tomado por doentes com problemas hereditários raros de intolerância à frutose, mal absorção de glucose-galactose ou insuficiência de sacarase-isomaltase.

Tomar Rennie com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar outros medicamentos. A acção de alguns antibióticos, como tetraciclina e quinolonas, pode ser afectada se o Rennie for tomado ao mesmo tempo. É conveniente fazer um intervalo de 2 horas entre a toma do Rennie e a toma de outro medicamento.

3. COMO TOMAR Rennie

Adultos e crianças com mais de 12 anos de idade:

Mastigar ou chupar 1 ou 2 comprimidos (pastilhas), de preferência 1 hora após a refeição e antes de deitar.

Em caso de azia ou dores de estômago mais intensas, pode aumentar o número de comprimidos para mastigar (pastilhas).

Não ultrapasse o máximo de 16 comprimidos para mastigar (pastilhas) por dia.

Não tome Rennie durante períodos longos sem indicação do seu médico.

Se tomar mais Rennie do que deveria

A utilização prolongada de doses altas, em especial nos doentes com problemas renais, pode causar hipercalcemia (excesso de cálcio no sangue) ou hipermagnesemia (excesso de magnésio no sangue) dando origem a sintomas gástricos (náuseas, vómitos) e fraqueza muscular anormal. Nestes casos, deve interromper o tratamento e consultar um médico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como os demais medicamentos, Rennie pode ter efeitos secundários.

Em raras ocasiões, foram observadas reacções alérgicas, tais como erupção cutânea, inchaço da língua, garganta ou lábios, dificuldade respiratória.

Caso detecte efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. CONSERVAÇÃO DE Rennie

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não existem instruções especiais de conservação.

Não utilize Rennie após expirar o prazo de validade indicado na embalagem e nos blisters.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o titular da autorização de introdução no mercado:

Bayer Portugal S.A.
Rua Quinta do Pinheiro, 5
2794-003 Carnaxide

Telefone 21 416 4200

Data de revisão do folheto
Janeiro 2005

Este folheto foi aprovado pela última vez em